




Союз
педиатров
России

ISSN 1682-5527

Сборник материалов XVII съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»

(Москва, 14–17 февраля 2013 г.)



Он-Лин версия журнала
www.pediatr-russia.ru www.spr-journal.ru



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVII СЪЕЗДА ПЕДИАТРОВ РОССИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

Москва, 14–17 февраля 2013 г.

Частота типичных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей старшего возраста и подростков

Загорский С.Э., Безлер Ж.А.

Полесский государственный университет, г.Пинск

Актуальность. На фоне роста частоты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) остается неуточненной ее распространенность в детском возрасте.

Цель исследования: определить частоту типичных симптомов ГЭРБ у детей старшего возраста и подростков г. Минска.

Пациенты и методы. С помощью специально разработанного опросника методом случайной выборки проанкетировано 1 386 детей и подростков 12-18 лет. Средний возраст ($M \pm m$) – 15,11±1,59 лет; девочек - 715 (51,6%), мальчиков – 671 (48,4%).

Опросник включал оценку следующих симптомов ГЭРБ: изжога, срыгивание, кислая отрыжка (ощущение кислого во рту), ощущение горечи во рту и чувство затрудненного/болезненного глотания. Согласно рекомендациям Монреальского консенсуса (2005) симптомы ГЭРБ расценивались как положительные при наличии вышеуказанных жалоб не реже одного раза в неделю.

Результаты. Типичные симптомы ГЭРБ отмечались у 19,9% респондентов (95% ДИ 17,8-22,0%), при этом изжога – в 7,4% случаев (95% ДИ 6,0-8,8%), срыгивание – в 7,2% (95% ДИ 5,8-8,6%), кислая отрыжка – в 8,4% (95% ДИ 6,9-9,9%), горечь во рту – в 4,5% (95% ДИ 3,4-5,6%) и нарушения глотания – в 1,7% (95% ДИ 1,0-2,4%). У 7,1% опрошенных детей и подростков (95% ДИ 5,7-8,5%) симптомы носили сочетанный характер. При отсутствии значительных различий частоты пищеводных симптомов ГЭРБ в зависимости от пола кислая отрыжка, горечь во рту и сочетанные жалобы статистически значимо чаще ($p < 0,05$ по критерию χ^2) встречались у девочек, чем у мальчиков (10,4; 6,3 и 9,0% против 6,3; 2,5 и 5,2%, соответственно).

Заключение. Типичные симптомы ГЭРБ с высокой частотой встречаются в период старшего детства. К гендерным особенностям субъективных проявлений ГЭРБ относится более высокая частота кислой отрыжки, горечи во рту и сочетанных жалоб у девочек по сравнению с мальчиками.