

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

**СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ 1

**ЗООТЕХНИЯ
ЭКОНОМИКА**

Под редакцией члена-корреспондента
НАН Беларуси В.К. Пестиса

Гродно 2010

УДК 636 (06)
УДК 631.1 (06)
ББК 45
ББК 65.32
С 29

Редакционная коллегия: В.К. Пестис (ответственный редактор), С.А. Тарасенко (зам. ответственного редактора), Я.В. Василюк, А.В. Глаз, В.М. Голушко, Ю.А. Горбунов, А.С. Григорьев, Г.А. Жолик, М.А. Кадыров, Н.В. Казаровец, А.В. Кильчевский, К.В. Коледа, В.П. Колесень, В.В. Малашко, В.А. Медведский, Г.Е. Раицкий, А.Д. Шацкий, А.П. Шпак, Н.С. Яковчик.

Рецензенты: Я.В. Василюк, И.И. Дегтяревич.

Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. : Т.1 / под ред. В.К. Пестиса. – Гродно : ГГАУ, 2010. – 478 с.
С 29

ISBN 978-985-6784-74-6

В сборнике излагаются научные исследования по зоотехнии и экономике, отражающие современное состояние и перспективы развития данных отраслей.

УДК 636 (06)
УДК 631.1 (06)
ББК 45
ББК 65.32

ISBN 978-985-6784-74-6 (т.1)
978-985-6784-75-3

© Коллектив авторов, 2010 **ISBN**
© УО «ГГАУ», 2010

УДК 636.4:575.174.015.3

ПОЛИГЕННЫЙ ХАРАКТЕР ДЕТЕРМИНАЦИИ ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ

Т.И. Епишко¹, Л.А. Танана², О.А. Епишко¹, В.В. Пешко²

¹ – УО «Полесский государственный университет», г. Пинск;

² – УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

(Поступила в редакцию 27.05.2010 г.)

Аннотация. В результате проведенных исследований проанализирована генетическая структура по генам **RYRI** и **H-FABP** различных популяций свиней белорусской мясной породы, разводимых в пяти хозяйствах Республики Беларусь. Выявлена закономерность увеличения показателей возраста достижения живой массы 100 кг (188,9 дня), среднесуточного прироста (718 г) и затрат корма на 1 кг прироста (3,68 к.ед.) у животных с генотипом **RYRIⁿⁿH-FABP^{h/h}H-FABP^{ad}**, которые превосходили сверстников с генотипом **RYRI^{NN}H-FABP^{h/h}H-FABP^{ad}** на 3,6 дня, 44 г и 0,23 к.ед. соответственно. Установленная закономерность увеличения показателей откормочной продуктивности до 5% свидетельствует о возможности использования данных генотипов в качестве маркеров при селекции свиней на повышение скорости и энергии роста.

Summary. As a result of the spent researches the genetic structure on genes *RYR1* and *H-FABP* the various populations of pigs of the Belarus meat breed planted in five economy of Byelorussia is analysed. Law of increase in indicators of age of achievement of live weight of 100 kg (188,9 days), a daily average gain (718 g) and expenses of a forage for 1 kg of a gain (3,68 fodder unit is revealed.) at animals with genotype *RYR1^{NN}H-FABP^{HH}H-FABP^{Dd}* for 3,6 days, 44 g and 0,23 fodder unit accordingly. The established law of increase in indicators of feeding efficiency to 5 % testifies to possibility of use of the given genotypes as markers at selection of pigs on increase of speed and energy of growth.

Введение. Интенсивная селекция на создание мясных генотипов в свиноводстве и использование пород ландрас и пьетрен привели, наряду с положительным эффектом увеличения содержания мяса в туше, к отрицательным последствиям: снижению качества мяса и появлению пороков **PSE** и **DFD**. Считается, что одной из основных причин снижения качества мяса является увеличение частоты встречаемости подверженных стрессу животных вследствие мутации в гене **RYR1**. Проведенное нами ДНК-тестирование свиней различных пород выявило значительный процент предрасположенных к стрессу животных, а у пород белорусской мясной и ландрас – чувствительных к стрессу [1,2,6].

Установлено, что частота встречаемости мутации в гене **RYR1** зависит от породной принадлежности, популяции, линии и половозрастной группы и колеблется от 0 до 30% у чистопородных животных, достигая 80% у помесей с участием пород ландрас и пьетрен [6].

Нами выявлено, что при несоответствии условий эксплуатации животных-носителей генотипов **RYR^{Nn}** и **RYRⁿⁿ** адаптационным возможностям наблюдается снижение метаболических и обменных процессов (до 22%), естественной резистентности (до 20%), оплодотворяющей способности (до 3%), воспроизводительной (до 11%), откормочной (до 5-7%) и мясной (до 8-10%) продуктивности, ухудшение качества мяса (**PSE**, **DFD**). Отмечается увеличение на 2,5% количества мертворожденных поросят и на 3,4% – аварийных опоросов [6].

Высокая энергия роста откормочного молодняка при производстве постной свинины привела к значительному ухудшению качества мяса, практически исчезли такие показатели, как ароматность, сочность и нежность. Одной из причин ухудшения технологических свойств свинины является резкое снижение содержания внутримышечного жира (**IMF**) [2,3].

Внутримышечный жир, являющийся критерием качества мяса, связан с его вкусовыми качествами и определяет такой показатель, как мраморность мяса [1,2].

Низкий коэффициент корреляции (0,11) показателей мраморности

мяса и толщины шпика указывает на возможность проведения селекции на повышение мраморности мяса без увеличения толщины шпика. Однако из-за низкой вариабельности признака, использование традиционных методов селекции не позволяет добиться значимых успехов. Решить данную проблему позволит использование в селекционном процессе генов-маркеров, детерминирующих содержание **IMF**, которые, в первую очередь, кодируют белки и ферменты, участвующие в обмене липидов. Это, прежде всего, белки, связывающие жирные кислоты, одним из классов которых являются белки **FABP**, обладающие функцией связывания длинных цепей жирных кислот [3,4].

Наиболее часто в зарубежной селекционной практике применяют ген **H-FABP**, что связано не только с детерминирующим действием данного белка на качество мяса, но и регулирующим влиянием его на рост и дифференцировку тканей [3, 4, 5]. Российскими коллегами установлено положительное влияние генотипов **H-FABP^{dd}** и **H-FABP^{HH}** на снижение толщины шпика, увеличение длины туши, скорости и энергии роста животных [1,2].

Согласно одному из основных положений генетики, наследование количественных признаков носит полигенный характер [7]. Однако большинство исследований посвящено изучению дифференцированного влияния генов **RYR1** и **H-FABP** на откормочную, мясную продуктивность и качество мяса свиней. Большой интерес представляет выявление влияния комплексных генотипов по данным генам на признаки продуктивности.

В связи с чем целью исследований явилось изучение полигенного характера детерминации откормочных качеств свиней, обусловленного генами **RYR1** и **H-FABP** для разработки ДНК-маркеров как основы создания новых мясных генотипов.

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» проведено ДНК-тестирование животных белорусской мясной породы различных популяций по генам **RYR1** и **H-FABP** (аллельные системы **H** и **D**) методом ПЦР-ПДРФ.

Для изучения полиморфизма генов **RYR1** и **H-FABP** (аллельные системы **H** и **D**) взяты биопробы ткани и крови свиней, разводимых в РСУП СГЦ «Заднепровский» Витебской, РСУП СГЦ «Западный» Брестской, РСУП СГЦ «Заречье» Гомельской, РУСП «Заречье» и РСУП «Клевица» Минской областей. Проведено более **1530** тестов.

Ядерная ДНК выделена перхлоратным методом. Все основные растворы для выделения ДНК, амплификации и рестрикции приготовлены по Маниатису и др. (1984).

Амплификация фрагментов генов **RYR1**, **H-FABP** (аллельные системы **H** и **D**) проведена методом ПЦР. В качестве основы использована методика Брэма Г. и Бренинга Б. (1993).

Концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и специфичность амплификата, а также результаты расщепления продуктов ПЦР рестриктазами **Hin6I**, **HinfI** и **HaeIII** оценены электрофоретическим методом в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием, с помощью трансиллюминатора в УФ-свете.

Для изучения ассоциации генов **H-FABP** и **RYR1** с откормочной продуктивностью, после проведения ДНК-тестирования, сформированы опытные группы (по **10** голов каждого генотипа) и поставлены на контрольный откорм на Гродненской КИСС, который проводился согласно ОСТ-10 3-86 «Свиньи: Метод контрольного откорма». В ходе эксперимента были учтены: возраст достижения живой массы **100** кг, среднесуточный прирост, затраты корма.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведения ДНК-тестирования животных белорусской мясной породы выявлен полиморфизм гена **H-FABP**, представленный аллельными системами **H** и **D**. Идентифицированы генотипы: **H-FABP^{Hh}**, **H-FABP^{hh}**, **H-FABP^{Hh}**, **H-FABP^{hh}**, **H-FABP^{DD}**, **H-FABP^{Dd}**, **H-FABP^{dd}** (таблица 1 и 2).

Таблица 1 – Генетическая структура по гену **H-FABP** (аллельная система **H**) популяции свиней белорусской мясной породы

Хозяйство	Частота встречаемости				
	Генотипов, %			Аллелей	
	HH	Hh	hh	H	h
РСУП СГЦ «Заднепровский»	77,3	22,4	0,3	0,85	0,15
РСУП СГЦ «Западный»	47,7	53,3	-	0,73	0,27
РУСП «Заречье» Минской обл.	43,5	43,5	13,0	0,65	0,35
РСУП СГЦ «Заречье» Гомельской обл.	53,3	40,0	6,7	0,73	0,27
ЗАО «Клевица»	67,3	30,9	1,8	0,83	0,17
<i>В среднем по породе:</i>	65,1	32,1	2,8	0,79	0,21

Установлено, что в среднем по белорусской мясной породе частота встречаемости животных с генотипом **H-FABP^{Hh}** составила **65,1%** и изменялась в зависимости от популяции от **43,5%** в РСУП «Заречье» Минской области до **77,3%** в РСУП «Заднепровский». Во всех изучаемых популяциях частота встречаемости животных с генотипом **H-FABP^{hh}** была низкой и составила **2,8%**, причем наибольшей величиной характеризовалась популяция РУСП «Заречье» Минской области – **13%**.

Анализ полиморфизма гена **H-FABP** аллельной системы **D** выявил, что концентрация аллелей **H-FABP^d** и **H-FABP^D** в среднем по белорусской мясной породе составила **0,35** и **0,65** соответственно, а встречаемость генотипов **H-FABP^{DD}**, **H-FABP^{Dd}** и **H-FABP^{dd}** – **12,7%**, **45,2%** и

42,1% соответственно.

Таблица 2 – Генетическая структура по гену **H-FABP** (аллельная система **D**) популяции свиней белорусской мясной породы

Хозяйство	Частота встречаемости				
	Генотипов, %			Аллелей	
	DD	Dd	dd	D	d
РСУП СГЦ «Заднепровский»	10,0	39,9	50,1	0,30	0,70
РСУП СГЦ «Западный»	6,7	60,0	33,3	0,37	0,63
РУСП «Заречье» Минской обл.	20,8	44,4	34,7	0,43	0,57
РСУП СГЦ «Заречье» Гомельской обл.	25,0	50,0	25,0	0,50	0,50
ЗАО «Клевица»	9,1	47,3	43,6	0,33	0,67
<i>В среднем по породе:</i>	<i>12,7</i>	<i>45,2</i>	<i>42,1</i>	<i>0,35</i>	<i>0,65</i>

Причем частоты встречаемости аллелей и генотипов у животных также изменялись в зависимости от популяции. Наиболее высокой концентрацией генотипа **H-FABP^{dd}** и аллеля **H-FABP^d** характеризовалась популяция из РСУП СГЦ «Заднепровский» – 50,1% и 0,70% соответственно. Встречаемость животных с гетерозиготным генотипом **H-FABP^{Dd}** колебалась от 39,9 до 60,0%.

Очевидно, что размах изменчивости генетической структуры по аллельным системам **H** и **D** гена **H-FABP** у белорусской мясной породы на межпопуляционном уровне характеризует интенсивность и направленность селекционных процессов на увеличение мясной продуктивности в данных хозяйствах.

Согласно данным научной литературы [2], одной из основных доминирующих причин снижения качества мяса является рост частот встречаемости подверженных стрессу животных, вызванный мутацией в гене **RYR1**.

Проведенное нами ДНК-тестирование животных белорусской мясной породы выявило значительный процент предрасположенных к стрессу животных, который в среднем по породе составил 20,5%, причем в популяции РСУП СГЦ «Заднепровский» диагностированы животные с генотипом **RYR1ⁿⁿ** (таблица 3).

Таблица 3 – Генетическая структура по гену **RYR1** популяции свиней белорусской мясной породы

Хозяйство	Частота встречаемости				
	Генотипов, %			Аллелей	
	NN	Nn	nn	N	n
РСУП СГЦ «Заднепровский»	77,3	22,2	0,5	0,88	0,12
РСУП СГЦ «Западный»	93,3	6,7	—	0,97	0,03
РУСП «Заречье» Минской обл.	89,5	10,5	—	0,95	0,05
РСУП СГЦ «Заречье» Гомельской обл.	100	—	—	1,00	—
ЗАО «Клевица» Минской	90,9	9,1	—	0,95	0,05
<i>В среднем по породе:</i>	<i>79</i>	<i>20,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,90</i>	<i>0,10</i>

Концентрация аллеля **RYR1^h** в гетерозиготной форме колебалась от 0 (в РСУП «СГЦ «Заречье» Гомельской области) до 0,120 (в РСУП «СГЦ «Заднепровский»), а встречаемость таких генотипов составила 0-22,2%. Высокая частота аллеля **RYR1^h** в популяции свиней РСУП «СГЦ «Заднепровский» вызвана использованием вводного скрещивания немецкого ландраса. Низкой частотой встречаемости мутации в гене **RYR1** характеризовалась популяция РСУП СГЦ «Западный» (6,7%).

Совершенно очевидно, что выявленный уровень полиморфизма гена **RYR1** у белорусской мясной породы не является постоянным и изменяется в зависимости от популяции, а также зависит от интенсивности и направленности отбора. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения ДНК-тестирования племенных и импортируемых животных.

Согласно полученным нами данным, наличие мутации в гене **RYR1^h** приводит к снижению откормочной и мясной продуктивности, а также ухудшению качества мяса и его технологических свойств [6].

Использование в селекции генов-маркеров **RYR1** и **H-FABP** позволит устранить негативные последствия и улучшить качество мяса свиней. Представляет интерес изучение комплексного влияния данных генов на показатели продуктивности (таблица 4).

Таблица 4 – Генетическая структура белорусской мясной породы свиней по генам **RYR1** и **H-FABP** (аллельная система H и D)

RYR1 и H-FABP (аллельная система H)		RYR1 и H-FABP (аллельная система D)	
Комплексные генотипы (n = 304)	Частота встречаемости генотипов, %	Комплексные генотипы (n = 344)	Частота встречаемости генотипов, %
RYR1 ^{NN} H-FABP ^{Hh}	47,4	RYR1 ^{NN} H-FABP ^{DD}	11,3
RYR1 ^{NN} H-FABP ^{Hh}	23,7	RYR1 ^{NN} H-FABP ^{Dd}	32,8
RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Hh}	3,3	RYR1 ^{NN} H-FABP ^{d1}	30,8
RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Hh}	18,1	RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{DD}	1,8
RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Hh}	6,9	RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Dd}	8,7
RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Hh}	0,3	RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{dd}	14,2
RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{Hh}	0,3	RYR1 ^{Nh} H-FABP ^{dd}	0,3

Анализ распределения частот комплексных генотипов **RYR1 H-FABP** в белорусской мясной породе выявил, что наибольший удельный вес занимают животные с генотипами: **RYR1^{NN}H-FABP^{Hh}**, **RYR1^{NN}H-FABP^{Hh}**, **RYR1^{Nh}H-FABP^{Hh}**, **RYR1^{NN}H-FABP^{Dd}**, **RYR1^{NN}H-FABP^{dd}** и **RYR1^{Nh}H-FABP^{dd}**, частоты встречаемости которых составили 47,4%, 23,7%, 18,1%, 32,8%, 30,8% и 14,2% соответственно. Необходимо отметить, что наиболее часто встречающимися комбинациями генотипов **H-FABP** (аллельная система H и D) с мутацией в гене **RYR1** являются -

RYR1^{Nh} H-FABP^{Hh} (18,1%) и RYR1^{Nh} H-FABP^{dd} (14,2%).

Для установления индивидуального и комплексного влияния генов **RYR1** и **H-FABP** на проявление продуктивных качеств нами изучена ассоциация полиморфизма данных генов с откормочной продуктивностью молодняка, разводимого в РУСП «Заречье» Минской обл. (таблицы 5, 6, 7).

Таблица 5 – Показатели откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы различных генотипов по гену **H-FABP**

Генотип	Возраст достижения массы 100 кг, дней	Среднесуточный прирост, г	Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед.
НН	189,6 ±1,2*	711 ±8,8	3,70 ±0,07
Hh	193,4 ±1,5	697 ±7,1	3,74 ±0,05
hh	194,2 ±2,0	723 ±33,3	3,84 ±0,22
DD	193,4 ±1,5	718 ±19,6	3,74 ±0,13
Dd	193,1 ±1,4	691 ±7,1	3,78 ±0,06
dd	189,1 ±1,3 ^x	716 ±8,8 ^x	3,68 ±0,07

Примечание: разница с показателями животных генотипа **Hh** достоверна при *P<0,05; с показателями генотипа **Dd** достоверна при ^xP<0,05

Установлено, что наиболее высокими показателями скорости роста характеризовался откормочный молодняк с генотипом **H-FABP^{Hh}** и **H-FABP^{dd}** (189,6 и 189,1 дней соответственно) в сравнении с животными генотипа **H-FABP^{Hh}** и **H-FABP^{Dd}** (разница составила 3,8 и 3,9 дня). Животные генотипа **H-FABP^{dd}** наряду с высокой скоростью отличались и более высокой энергией роста (716 г) и низкими затратами корма (3,68 к.ед.), что превышало аналогичные показатели у животных генотипа **H-FABP^{Dd}** на 25 г и 0,1 к.ед. соответственно.

Изучение комплексного влияния генов **RYR1** и **H-FABP** (аллельная система Н) на показатели откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы свиней выявило положительные ассоциации с рядом признаков (таблица 6).

Таблица 6 – Показатели откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы различных генотипов по генам **RYR1** и **H-FABP**

Генотип	Возраст достижения массы 100 кг, дней	Среднесуточный прирост, г	Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед.
NNHh	189,4 ±1,4*	712 ±10,1	3,71 ±0,08
NNHh	194,3 ±1,9	691 ±9,3	3,78 ±0,07
NNhh	194,2 ±2,0	723 ±33,3	3,84 ±0,22
NnHh	191,2 ±1,8	710 ±6,9	3,64 ±0,04
NNDD	194,0 ±1,6	716 ±21,7	3,77 ±0,14
NNDd	193,5 ±1,7	687 ±8,9	3,81 ±0,08
NNdd	188,9 ±1,5 ^x	718 ±10,2	3,68 ±0,08
NnDd	191,8 ±2,3	704 ±2,0	3,67 ±0,01

Примечание: разница с показателями животных генотипа **RYR1^{Nh} H-FABP^{Hh}** достоверна при *P<0,05; с показателями животных генотипа **RYR1^{Nh} H-FABP^{Dd}** достоверна при ^xP<0,05

Так, наиболее высокими показателями скорости роста характеризовались животные с комплексными генотипами: $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}}$ и $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{dd}}$, у которых данные показатели были выше на 4,8 и 5,1 дня ($P < 0,05$) в сравнении с животными генотипов $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{Hh}}$ и $\text{RYR1}^{\text{Nn}} \text{H-FABP}^{\text{DD}}$ соответственно.

У животных с генотипом $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{dd}}$ наблюдалось превосходство показателей энергии роста и затрат корма на 1 кг прироста на 31 г и на 0,13 к.ед. соответственно, в сравнении с подсвинками генотипа $\text{RYR1}^{\text{Nn}} \text{H-FABP}^{\text{Dd}}$.

Изучено комплексное влияние генов и RYR1 H-FABP (аллельные системы H и D) на формирование признаков откормочной продуктивности (таблица 7).

Таблица 7 – Показатели откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы различных генотипов по генам RYR1 и H-FABP

Генотип	Возраст достижения массы 100 кг, дней	Среднесуточный прирост, г	Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед.
NNHHdd	$188,9 \pm 1,5^*$	$718 \pm 10,2^*$	$3,68 \pm 0,08$
NNHHDd	$192,5 \pm 2,5$	$674 \pm 16,0$	$3,91 \pm 0,37$
NNHhDD	$194,0 \pm 1,5$	$705 \pm 3,4$	$3,64 \pm 0,02$
NNHhDd	$194,3 \pm 2,5$	$685 \pm 12,9$	$3,84 \pm 0,10$
NnHhDd	$191,8 \pm 2,3$	$704 \pm 2,0$	$3,67 \pm 0,01$

Примечание: разница с показателями животных генотипа $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}} \text{H-FABP}^{\text{Dd}}$ достоверна при $*P < 0,05$

Установлено, что наиболее высокими показателями возраста достижения живой массы 100 кг (188,9 дня), среднесуточного прироста (718 г) и затрат корма на 1 кг прироста (3,68 к.ед.) отличались животные с генотипом $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}} \text{H-FABP}^{\text{dd}}$ и превосходили сверстников с генотипом $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}} \text{H-FABP}^{\text{Dd}}$ на 3,6 дня, 44 г и 0,23 к.ед. соответственно.

Заключение. 1. Установлено увеличение показателей откормочной продуктивности у животных белорусской мясной породы с генотипами $\text{H-FABP}^{\text{HH}}$ и $\text{H-FABP}^{\text{dd}}$. **2.** Выявлена закономерность увеличения показателей возраста достижения живой массы 100 кг (188,9 дня), среднесуточного прироста (718 г) и затрат корма на 1 кг прироста (3,68 к.ед.) у животных с генотипом $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}} \text{H-FABP}^{\text{dd}}$, которые превосходили сверстников с генотипом $\text{RYR1}^{\text{NN}} \text{H-FABP}^{\text{HH}} \text{H-FABP}^{\text{Dd}}$ на 3,6 дня, 44 г и 0,23 к.ед. соответственно. **3.** Установленные закономерности увеличения показателей откормочной продуктивности до 5% свидетельствуют о возможности использования данных генотипов в качестве маркеров при селекции свиней на повышение скорости и энергии роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арсиенко, Р.Ю. Полиморфизм гена белка, связывающего жирные кислоты (Н-ФАВР), и его влияние на хозяйственно-полезные признаки свиней: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.23 / Р.Ю. Арсиенко. Дубровицы, 2003. – 20 с.
2. Зиновьева, Н.А. Проблемы биотехнологии и селекции сельскохозяйственных животных / Н.А. Зиновьева, Л.К. Эрнст // Дубровицы, 2006. – 326 с.
3. Gerbens, F. Genetic control of intramuscular fat accretion. Muscle development of live-stock animals: physiology, genetics and meat quality. 2004; 343-362.
4. The effect of adipocyte and heart fatty acid-binding protein genes on intramuscular fat and backfat content in Meishan crossbred pigs / F. Gerbens [et al.] / *Journal of Animal Science*. (2000). v. 78(3). – P. 552-559.
5. A QTL for intramuscular fat and backfat thickness is located on porcine Chromosome 6 / C. Ovilo [et al.] / *Mammalian Genome*. 2000, 11: 4. – P. 344-346.
6. Шейко, И.П. Генетические методы интенсификации селекционного процесса в свиноводстве / И.П. Шейко, Т.И. Епишко // Жодино, 2006. – 197 с.
7. Сердюк, Г.Н. Иммуногенетика свиней: теория и практика / Г.Н. Сердюк. – СПб : Лекс-Стар, 2002. – 390 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗООТЕХНИЯ

Голушко А.В., Капанский А.А., Колесень В.П. «ФЕКОРД-2004С» – ЭФФЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СВИНЕЙ	3
Горбунов Ю.А., Минина Н.Г., Дешко А.С., Козел А.А. МЕТОД СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ У КОРОВ-ДОНОРОВ	111
Горчакова О.И. ВЛИЯНИЕ ДЕБИКИРОВАНИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА РЕМОНТНЫМ МОЛОДНЯКОМ ЯИЧНЫХ КУР	19
Горчаков В.Ю., Киселев А.И. ВЛИЯНИЕ АНТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА КУР	224
Григорьев Д.А., Богданович П.Ф. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА	331
Добрук Е.А., Пестис В.К., Сарнацкая Р.Р., Тарас А.М., Фролова Л.М., Наумова Г.В., Яковчик Н.С. ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ САПРОПЕЛЯ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ	39
Добрук Е.А., Пестис В.К., Сарнацкая Р.Р., Тарас А.М., Фролова Л.М., Наумова Г.В., Яковчик Н.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ ИЗ САПРОПЕЛЯ ПРИ СИЛОСОВАНИИ ТРАВЯНИСТЫХ КОРМОВ	466
Рекель А., Дюба М.И., Мордечко П.П. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ КОРМОВЫХ АНТИБИОТИКОВ ДРУГИМИ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА В РАЦИОНАХ ОТКОРМОЧНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ	55
Епишко Т.И., Епишко О.А., Скуловец М.В., Яцына О.А. ДНК-ДИАГНОСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И МАРКЕРЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К МАСТИТАМ	63
Епишко Т.И., Танана Л.А., Епишко О.А., Пешко В.В. ПОЛИГЕННЫЙ ХАРАКТЕР ДЕТЕРМИНАЦИИ ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ	69
Лемешевский В.О. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ НА КАЧЕСТВО МЯСА БЫЧКОВ	77