


ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА 15 лет спустя

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ



МИНСК
«ТЕСЕЙ»
2001

БелНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ РНИУП "ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ"
КОМИТЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА 15 ЛЕТ СПУСТЯ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Материалы областной научно-практической конференции

Могилев, 26 апреля 2001 г.

Под общей редакцией Н.Г. Кручинского

Минск
ТЕСЕЙ
2001

УДК 614.876(476)(043.2)
ББК 51.20(4Бен)
Ч-49

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Могилевского областного исполнительного комитета*

Редакционная коллегия:

канд. мед. наук, доц. *Н.Г. Кручинский* (главный редактор)
канд. техн. наук *А.Ф. Мирончик* (заместитель главного редактора)
канд. техн. наук *О.И. Всеволодова* (ученый секретарь)

Рецензенты:

д-р мед. наук, проф. *В.А. Остапенко*
д-р биол. наук, проф. *А.А. Мичютин*

Ч-49 **Чернобыльская катастрофа 15 лет спустя:** Науч.-практ.
аспекты пробл.: Материалы обл. науч.-практ. конф. Могилев,
26 апр. 2001 г. / Под общ. ред. Н.Г. Кручинского.— Мн.: Тесей,
2001.— 416 с.

ISBN 985-463-018-8.

В сборник включены материалы научных исследований, проведенных в 1991–2000 гг. научными и лечебно-профилактическими учреждениями Могилевской области и республики. Исследования посвящены теоретическому, экспериментальному и практическому изучению механизмов длительного низкодозового радиационного воздействия вследствие катастрофы на ЧАЭС.

УДК 614.876(476)(043.2)
ББК 51.20(4Бен)

ISBN 985-463-018-8

© БелНИИ экологической и профессиональной патологии, 2001
© Тесей, 2001

АЛОПЕЦИЯ У ДЕТЕЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА 7-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

Е.К. Яремченко, Т.А. Гракова, В.Ф. Голубь, Т.И. Власова, А.И. Сидорович, С.М. Остапенко, Н.Г. Кручинский

БелНИИ экологической и профессиональной патологии (Могилев)

Алопеция — выпадение волос (облысение) на местах присущего им роста — заболевание, встречающееся у детей в любом возрасте, чаще старше 3 лет [1, 5].

Очаговая алопеция характеризуется спонтанным, незамеченным вначале, часто внезапным выпадением волос на одном или нескольких ограниченных участках волосистой части головы. Обычно лишённые волос участки бывают правильно округлой формы. Кожа на поражённых участках по виду может быть совершенно нормальной, без покраснения, чешуек и атрофии. При этом её рельеф сохранен, но она более вялая, гипотоническая, отверстия волосяных фолликулов кажутся расширенными. При ещё не вполне оформленных очагах волосы по их периферии легко выдергиваются. Сами волосы могут быть мало или совсем не изменены, но чаще истончены, более светлого цвета, а концы волос могут быть разветвленными, как “метелка”, или иметь на плешинах вид пеньков [2, 3].

Вирусная и бактериальная концепции этиологии некоторых форм алопеции у детей указывают на значение алергизирующего влияния стрепто-стафилококковой флоры на сально-волосяный аппарат и механизмы синтеза кератина в корне волоса и сочетаются с такими патогенетическими факторами, как нейроэндокринные расстройства, обменные нарушения, а также местные анатомофизиологические изменения. Отмечен рост алопеции у детей в период эпидемии ОРВИ. После эпидемии алопеции в Черновцах возникло предположение о многофак-

торности синдрома, а именно сочетанном воздействии на пилоситы волосяных мешочков тяжелых металлов: талия, бария, свинца и др., а также вируса, в результате которого нарушается рост волос [5].

По данным Вильнюсского университета, большое значение имеют факторы электромагнитного и электростатического полей (у многих детей, проживающих вблизи электротрансформаторных подстанций или телевизионных башен, отмечались случаи алопеции).

Какая генеза алопеции, пока тяжело только предположительно говорить о совокупности влияния химических и физических факторов.

Лечением алопеции в БелНИИЭПП начали заниматься с 1993 г. В педиатрическом отделении выделили койки, в поликлиническом — организовали прием врача-педиатра, прошедшего подготовку в 1992 и 1995 гг. в Казани.

С 1996 г. наблюдалось диагностическое наблюдение за 375 детьми от 1 года 6 мес. до 15 лет (г. Могилев — 76,3%, Могилевская область — 23,7%, в том числе из контролируемых районов — около 9%), у которых впервые был установлен диагноз — очаговая алопеция. Очаговая алопеция I и II степени диагностирована у 239 детей (1996 г. — 90; 1997 г. — 120; 1998 г. — 133; 1999 г. — 180; 2000 г. — 211).

Длительность заболевания с момента обнаружения очага облысения и обращения к врачу составила в среднем от 2 недель до одного месяца.

Следует отметить, что у 87% наблюдаемых выявлена сопутствующая патология. Так, эндокринная патология (эндемический зоб IA—IB ст.) диагностирована в 1996 г. — у 30,5% больных; в 1997 г. — у 33,5; в 1998 г. — у 27,6; в 1999 г. — у 28,3%; в 2000 г. — у 32%. Гастроэнтерологическая патология (гастриты, гастродуодениты, дискинезии клиника и желчевыводящих путей) в 1996 г. составила 48,4%; в 1997 г. — 61,4; в 1998 г. — 42,7; в 1999 г. — 50,1 и в 2000 г. — 58,7%. Аллергопатология (атопический дерматит, рецидивирующая крапивница, бронхиальная астма) в 1996 г. составила 15,8%; в 1997 г. — 19,7; в 1998 г. — 20,1; в 1999 г. — 22,7, в 2000 г. — 23,5%. Основную возрастную группу среди заболевших (более 58%) составили дети пубертатного периода (11—15 лет), что позволяет высказать предположения о гормональном дисбалансе в патогенезе заболевания. Нами не установлена зависимость частоты возникновения и тяжести течения алопеции от пола ребенка.

Учитывая то, что в настоящее время отсутствует единое мнение об этиологии и патогенезе очаговой алопеции, проводили комплексное лечение с учетом выявленной в ходе обследования и сопутствующей патологии. Для наружной (местной) терапии больных алопецией с целью стимуляции роста волос проводили втирание в очаги настоек (зверобоя, прополиса, перца стручкового и т.п., болтушек, содержащих

салициловую кислоту, димексид, серу, касторовое масло и 96%-ный спирт) [4].

Одновременно широко использовали физиотерапевтические методы лечения (Д-ареанализация волосистой части головы, электро-массаж волосистой части головы, гальванизация шейных симпатических узлов, поляризованный свет на очаги алопеции с помощью аппарата "Бионик", ультразвук на шейные симпатические узлы). Примерно с конца 1998 г. применяли очаговую лазеротерапию, обкалывание раствором гидрокартизона очагов облысения, массаж шейных симпатических узлов и волосистой части головы. Для улучшения регенерации кожных покровов назначали витамины А, В₁₅, РР, фолиевую кислоту в лечебных дозах и мультивитамины с микроэлементами (алиговит, центрум, витус и т.п.), так как не исключается, что дефицит некоторых микроэлементов в организме приводит к ранней алопеции.

Всем детям проводили курс энтеросорбции энтеросорбентом Белосорб—П в течение 7—10 дней из расчета 0,1 г/кг массы тела в сутки в два приема.

С целью нормализации метаболических процессов в области волосяного сосочка применялись АТФ, церебролизат, экстракт алоэ. Из средств, обладающих сосудорасширяющим действием и улучшающих васкулиризацию, назначали курантил, кавентон и другие препараты этих групп. Так как метаболические процессы в волосах тесно связаны с состоянием обменных процессов в организме, параллельно рекомендовали включать в пищевой рацион достаточное количество белка, микроэлементов (говядина, свинина, мясо кур, индейки, рыба и морепродукты, листовые овощи, бобовые, фрукты, орехи и т.д.).

Всем больным проводился курс стационарного лечения в течение 19—21 дня, затем на протяжении одного-двух месяцев — амбулаторное лечение с 2—3-месячными перерывами на первом году наблюдения; на втором году диспансеризации — противорецидивное лечение не реже одного раза в квартал; на третьем году не менее 2 раз в год, преимущественно в весенне-осенние периоды.

Частота рецидивов алопеции, по нашим данным, составила около 25,1%. Как правило, рецидивы возникали на первом году наблюдения и более чем в половине случаев у детей с крупными очагами поражения волосяного покрова (алопецией II ст.).

Выздоровление диагностируется при отсутствии рецидивов заболевания в течение трех лет и составляет, по нашим данным, от 11 до 13%.

Учитывая анатомо-функциональные особенности детского организма, довольно высокую частоту патологии у детей с алопецией, считаем более рациональным проводить лечение этой патологии в учреждениях педиатрического профиля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаскевич В.П., Мяделец О.Д., Тихоловская И.В. Алопеция. М.: Медицина, 2000. 112 с.
2. Алопеция: Метод. рекомендации. Мн., 1995. 18 с.
3. Смирнова Е.В., Лобанов Ю.Ф. Алопеция у детей // Педиатрия. 2000. № 3.
4. Сосновский А.Т., Жданова Н.И. Лечение очагового облысения // Здоровоохранение Беларуси. 1995. № 8.
5. Рук А., Даубер Р. Болезни волос и волосистой части головы. М., 1985. 139 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 13

Адамович В.И., Корнеева И.П.

Состав кишечной микрофлоры у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, подвергшихся радиационному воздействию 14

Барановская Е.И.

Внутриматочная герпетическая инфекция у женщин при воздействии малых доз радиоактивного облучения 15

Барановская Е.И., Мельникова Л.Н., Бельская С.В., Думова С.В.

Роль хламидийной урогенитальной инфекции в патологии женщин, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами 18

Близнюк А.И.

Апоптоз как показатель синдрома ускоренного старения: биохимические аспекты 20

Бронский В.И., Осипенко А.Н.

Факторный анализ психосоматического здоровья взрослых сельских жителей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы 23

Вернер А.И., Мишин А.В.

Тканевое дыхание и структура тимуса при инкорпорации радиоцезия 29

Воропаев Е.В.

Анализ диагностики герпесвирусных инфекций в Республике Беларусь 31

Горчаков А.М., Горчакова Ф.Т., Коростелева И.Н., Прокопович А.С., Кручинский Н.Г.

Радиоэкологический биомониторинг на основе люминесцентного анализа живых клеток человека и биоты 36

Дорошкевич С.В., Дорошкевич Е.Ю.

Нарушение эмбриогенеза центрального канала спинного мозга белой крысы под влиянием рентгеновского облучения 40

Доценко Э.А., Булахов А.Н., Батов В.В., Козыро В.И., Латто О.Г., Юпатов Г.И., Близнюков Б.Ф.

Гипобароадаптация как метод профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний 43

| | |
|--|----|
| <i>Дымова Л.Г.</i> | |
| Методика многокритериальной оценки состояния здоровья | 48 |
| <i>Ильичева И.Ю.</i> | |
| Электрофизиологический анализ состояния головного мозга при длительном низкодозовом радиационном воздействии | 55 |
| <i>Корнеева И.П., Адамович В.И.</i> | |
| Синдром холестаза у пациентов с хронической патологией печени, постоянно проживающих на территориях, загрязненных радиону- клидами вследствие катастрофы на ЧАЭС: диагностика и лечение . . . | 61 |
| <i>Корытько С.С.</i> | |
| Цитогенетический статус ликвидаторов 1986–1987 гг. | 62 |
| <i>Кручинский Н.Г.</i> | |
| Механизмы гемостазиопатий у населения, подвергнувшегося и подвер- гающегося в результате аварии на ЧАЭС воздействию низкоуровневой ионизирующей радиации | 67 |
| <i>Кручинский Н.Г., Тепляков А.И., Теплякова Д.В.</i> | |
| Длительное профессиональное и экологическое низкоуровневое радиа- ционное воздействие: общие патогенетические механизмы. Сообщение 1. | 69 |
| <i>Кручинский Н.Г., Тепляков А.И., Теплякова Д.В.</i> | |
| Длительное профессиональное и экологическое низкоуровневое радиационное воздействие: общие патогенетические механизмы. Сообщение 2. | 74 |
| <i>Кручинский Н.Г., Остапенко С.М., Тепляков А.И., Наумов А.Д., Всеволодова О.И., Горчаков А.М., Прищепова Е.В., Прокопович А.С., Дуброва Ю.Е., Сосновская Е.Я., Нестеров В.Н., Остапенко В.А.</i> | |
| Патогенетические особенности изменения состояния здоровья у насе- ления Могилевской области, пострадавшего в результате Чернобыль- ской катастрофы | 77 |
| <i>Крюк Ю.Е.</i> | |
| Реконструкция доз внутреннего облучения щитовидной железы йодом-131 методом радиозекологического моделирования для жителей Могилевской области | 85 |
| <i>Кучинский Д.Г.</i> | |
| Организация Белорусского государственного регистра населения, по- страдавшего от катастрофы на ЧАЭС в Могилевской области | 88 |

| | |
|--|-----|
| <i>Маленченко А.Ф., Сушко С.Н.</i> Оценка зависимости “доза—эффект” и эффективности единицы дозы в процессах опухолеобразования при сочетанном действии ионизи- рующего излучения и химического канцерогена | 90 |
| <i>Медведева М.И., Суслов В.С., Сидорович А.И., Егорова Н.Н., Борисова Т.К., Клапопоцкая А.В.</i> Анализ работы детского диспансерного отделения клиники БелНИИЭПП | 93 |
| <i>Мельникова Л.Н., Барановская Е.И.</i> Хламидийная уrogenитальная инфекция как причина бесплодия у женщин, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами | 95 |
| <i>Мельнов С.Б.</i> Молекулярно-генетические эффекты малых доз радиации | 96 |
| <i>Мельнов С.Б., Остапенко В.А., Кручинский Н.Г., Рыбальченко О.А., Шиманец Т.В., Нестеров В.Н.</i> Динамика цитогенетического статуса детей и подростков, подверг- шихся хроническому радиационному воздействию. | 103 |
| <i>Наумова Г.И., Наумов А.Д.</i> Головная боль напряжения у девочек-подростков, пострадавших в резуль- тате катастрофы на Чернобыльской АЭС | 110 |
| <i>Нестеров В.Н.</i> Частота мутаций в мини-сателлитной фракции ДНК у жителей Могиле- вской области, проживающих на территориях, загрязненных радио- нуклидами, после аварии на Чернобыльской АЭС | 114 |
| <i>Онищенко А.Н.</i> Влияние предварительного радиационного облучения подопытных животных в малой дозе на течение острой бактериальной псевдо- туберкулезной инфекции. | 120 |
| <i>Онищенко А.Н., Милютин А.А., Хоменко А.И.</i> Пострадиационные изменения морфофункционального состояния нейтрофилов при действии малых доз ионизирующей радиации | 125 |
| <i>Поплыко М.Г., Гусева Г.Ф., Тимохина Н.И., Кудряшов В.П.</i> Реакция костного мозга, периферической крови и костной ткани на облучение инкорпорированными Sr-90, Cs-137 и облучение γ -излуче- нием крыс | 129 |
| <i>Пухтеева И.В., Герасимович Н.В., Милютин А.А.</i> Влияние дексаметазона на состояние гомеостаза внутриклеточного кальция в тимocyтах крыс в отдаленные сроки после облучения | 131 |

| | |
|---|-----|
| <i>Рысь Н.Г., Иванова В.И., Толстая Е.В., Жуковская Л.В.</i> Критерии эффективности оздоровления детей с позиции педиатрической кардиологии | 135 |
| <i>Савченко И.М.</i> Особенности анестезии экстренного родоразрешения при сопутствующем пиелонефрите у беременных, подвергшихся воздействию малых доз радиации | 138 |
| <i>Савченко И.М.</i> Особенности послеоперационной интенсивной терапии у родильниц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, проживающих на территории радиоактивного загрязнения. | 142 |
| <i>Селиванов В.Н., Кононкова Н.П.</i> Влияние Чернобыльской катастрофы на динамику эндокринной патологии в Могилевской области | 145 |
| <i>Сосновская Е.Я.</i> Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Могилевской области, проживающего в населенных пунктах с различной плотностью загрязнения ¹³⁷ Cs | 149 |
| <i>Сосновская Е.Я.</i> Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Могилевской области после катастрофы на Чернобыльской АЭС | 156 |
| <i>Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Сидоренко Г.Г.</i> Возрастные особенности реакции альвеолярных макрофагов мышей на сочетанное воздействие ионизирующего излучения и техногенных загрязнителей | 163 |
| <i>Тарарук Т.А.</i> Эффекты пролонгированного γ -облучения на систему циклических нуклеотидов тромбоцитов крыс | 166 |
| <i>Тепляков А.И.</i> Системный анализ нарушения межклеточных взаимодействий при атерогенезе в условиях низкоуровневого радиационного воздействия. Сообщение 1 | 170 |
| <i>Тепляков А.И., Прищепова Е.В., Кручинский Н.Г.</i> Системный анализ нарушения межклеточных взаимодействий при атерогенезе в условиях низкоуровневого радиационного воздействия. Сообщение 2 | 174 |

| | |
|---|-----|
| <i>Тепляков А.И., Прищепова Е.В., Чегерова Т.И., Кручинский Н.Г.</i> | |
| Системный анализ нарушения межклеточных взаимодействий при атерогенезе в условиях низкоуровневого радиационного воздействия. Сообщение 3 | 177 |
| <i>Тимохина Н.И., Конопля Е.Ф., Поплыко М.Г., Гусева Г.Ф.</i> | |
| Характер изменения морфофункциональных и цитологических показателей ткани легкого при внешнем и внутреннем облучении в сравнительно небольших дозах | 179 |
| <i>Хмара И.М.</i> | |
| Особенности назначения тироксина больным раком щитовидной железы после тиреоидэктомии | 181 |
| <i>Хмара И.М.</i> | |
| Электрокардиографические особенности больных раком щитовидной железы на фоне супрессивной терапии | 186 |
| <i>Чегерова Т.И., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В., Чегеров В.Г.</i> | |
| Методика расчета дозовых нагрузок населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, с учетом неопределенности исходных данных | 191 |
| <i>Чернегин К.В., Егорова Е.Л., Медведева М.И.</i> | |
| Влияние радиационного фактора на некоторые антропометрические параметры у детей, проживающих в различных экологических условиях | 198 |
| <i>Шевченко А.А.</i> | |
| Особенности туберкулеза органов дыхания у хронических алкоголиков в постчернобыльский период | 201 |
| Раздел 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ | |
| 207 | |
| <i>Агеев В.Ю., Автушко М.И., Ласько Т.В., Лисейкова М.И.</i> | |
| Об использовании органоминеральных композиций на основе цеолитов для снижения перехода ⁹⁰ Sr и ¹³⁷ Cs из почвы в растения | 208 |
| <i>Барашенко В.В., Мирончик А.Ф., Карпович Т.М., Ветрова Н.Н., Сташевский А.В.</i> | |
| Экономическая эффективность проведения защитных мероприятий в хозяйствах Могилевской области для обеспечения получения нормативно чистого зерна по содержанию стронция-90 | 212 |
| <i>Барашенко В.В., Мирончик А.Ф., Очковская Л.В., Карпович Т.М., Ветрова Н.Н., Сташевский А.В.</i> | |
| Плодородие почв и их продуктивность как факторы, определяющие получение зерна, отвечающего требованиям РДУ-99 по содержанию стронция-90 | 215 |

| | |
|---|-----|
| <i>Богдевич И.М., Очковская Л.В., Барашенко В.В., Каленик Г.И., Соловьева С.И.</i> | |
| Прогноз загрязнения зерновых культур и картофеля радионуклидами цезия-137 и стронция-90 в Наровлянском районе на основании электронной республиканской базы данных агрохимических и радиологических свойств почв. | 219 |
| <i>Василевский И.А.</i> | |
| Санитарные нормы и правила СанПиН 10-124 РБ 99. Проблемы радиационного контроля | 223 |
| <i>Василенко З.В., Стефаненко Н.В.</i> | |
| Пищевая добавка радиозащитного действия | 224 |
| <i>Василенко З.В., Редько В.В.</i> | |
| К вопросу организации лечебно-профилактического питания населения Республики Беларусь | 228 |
| <i>Гаевский И.В., Литницкий Л.В., Шарамков В.А., Шклярков А.А., Завалкевич А.Ф., Лысенков А.А.</i> | |
| Оценка радиационно-гигиенической ситуации на территории Могилевской области | 232 |
| <i>Гапоненко В.И., Монтик Т.А., Жебракова И.В.</i> | |
| Физиолого-биохимические проявления действия радиационного фактора у растений энотеры двулетней в условиях ПГРЭЗ | 237 |
| <i>Григорьев Г.К., Судас А.С.</i> | |
| О радиоактивном загрязнении молока и способах его снижения в личных подсобных хозяйствах в зимне-стойловый период содержания коров. | 241 |
| <i>Круглень В.Е., Вороницкая Ю.П.</i> | |
| Обучение населения – важный аспект минимизации последствий радиоактивного заражения территории | 243 |
| <i>Литницкий Л.В., Костицкая Е.В.</i> | |
| Вопросы организации индивидуального дозиметрического контроля населения в восстановительный период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 245 |
| <i>Лозюк И.А., Судас А.С.</i> | |
| Выращивание нетрадиционных культур на загрязненных радионуклидами землях южной агроклиматической области Белорусского Полесья | 248 |
| <i>Мацко В.П., Гапоненко В.И., Кравченко В.А., Сквернюк И.И., Шамаль Н.В., Барыбин Л.Н., Орехова М.Г.</i> | |
| Эколого-физиологические факторы накопления радионуклидов в системе “почва–растения”. | 250 |

| | |
|--|-----|
| <i>Мирончик А.Ф., Барашенко В.В., Раманюк Д.М., Карпович Т.М., Ветрова Н.Н., Сташевский А.В.</i> | |
| Особенности производства зерновых культур на продовольственные цели по содержанию стронция-90 в хозяйствах Могилевской области | 255 |
| <i>Мирончик А.Ф., Барашенко В.В., Карпович Т.М., Ветрова Н.Н., Сташевский А.В.</i> | |
| Пригодность почв для возделывания зерновых культур на продоволь- ственные цели по содержанию стронция-90 в хозяйствах Могилевской области | 258 |
| <i>Наумчик А.В., Аверин В.С., Цуранков Э.Н., Калиниченко С.А.</i> | |
| Козоводство Гомельской области в постчернобыльский период . . . | 259 |
| <i>Нестеренко В.Б., Скачко А.И., Бабенко В.И., Еркович Т.В., Голуб В.В.</i> | |
| Радиационные измерения накопления Cs-137 в организме матерей с детьми из населенных пунктов Беларуси, пострадавших от Черно- быльской катастрофы | 262 |
| <i>Осипенко А.Н.</i> | |
| Ценностные установки и критерии социально-экономической реоби- литации загрязненных территорий | 269 |
| <i>Осипенко А.Н.</i> | |
| Об использовании информационных технологий в социально-эконо- мическом развитии сельскохозяйственных предприятий на загрязнен- ных территориях | 273 |
| <i>Персикова Т.Ф.</i> | |
| Качество зерна яровой пшеницы в зависимости от условий питания | 278 |
| <i>Сарасеко Е.Г.</i> | |
| Влияние минеральных добавок на переход ¹³⁷ Cs из торфяно-болотной почвы в растения | 283 |
| <i>Севастьянов П.В., Дымова Л.Г., Чегерова Т.И., Чегеров В.Г., Севастьянов Д.П.</i> | |
| Методика комплексной оценки экологического состояния регионов для принятия оптимальных управленческих решений | 286 |
| <i>Стрибук П.Н.</i> | |
| Математическое обеспечение корректной оценки распределения радио- экологического параметра по разнотипным статистическим описаниям | 291 |
| <i>Судас А.С., Зайцев А.А.</i> | |
| Особенности поведения радионуклидов ¹³⁷ Cs и ⁹⁰ Sr на осушенных землях Брестской области | 296 |

| | |
|---|------------|
| <i>Судас А.С., [Филипенко Н.К], Зайцев А.А.</i> Варьирование уровней и коэффициентов накопления радионуклидов попадными травостоями в зависимости от интенсивности обработки дернины | 297 |
| <i>Судас А.С., Трухан Л.А.</i> Обоснование выбора стационарных участков наблюдения за радио- экологической обстановкой. | 298 |
| <i>Тешковский А.В., Жученко Ю.М.</i> Модель потоков радионуклидов из сельскохозяйственных и естествен- ных экосистем. | 300 |
| <i>Тешковский А.В.</i> Прогнозирование радиационного состояния региона на основе анализа потоков радионуклидов | 305 |
| <i>Тимофеев А.С.</i> Применение современных информационных технологий для модели- рования сельскохозяйственного производства на загрязненных радио- нуклидами территориях | 310 |
| <i>Цыганов А.Р., Чернуха Г.А.</i> Особенности подготовки специалистов по сельскохозяйственной радиоэкологии | 315 |
| <i>Чернуха Г.А.</i> Совершенствование системы удобрений для проса, выращиваемого в условиях радиоактивного загрязнения. | 316 |
| <i>Шавлинский О.А., Добровольская Л.Е.</i> Локальное орошение овощных культур как фактор снижения радиацион- ной нагрузки | 321 |
| <i>Шарамков В.А.</i> Оценка качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) по пока- зателю содержания радионуклидов, заготавливаемого на территории Могилевской области | 324 |
| <i>Шашко Л.Н., Судас А.С.</i> Оптимизация землепользования сельскохозяйственных предприятий в условиях радиоактивного загрязнения земель | 328 |
| Раздел 3. КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 331 |
| <i>Галиновский С.П., Тепляков А.И., Бездникова С.В., Коваленко С.Д.</i> Заболееваемость медицинских работников Могилевской области | 332 |
| <i>Галиновский С.П.</i> Пчелиный яд и прополис в комплексной реабилитации больных нейродермитом. | 334 |

| | |
|---|-----|
| <i>Галиновский С.П.</i> Некоторые методологические аспекты апитоксинотерапии. | 335 |
| <i>Галиновский С.П.</i> Продукты пчеловодства в комплексной реабилитации больных гастроэнтерологического профиля | 338 |
| <i>Ильичева И.Ю., Теплякова Д.В., Чегерова Т.И., Тепляков А.И., Стицарев А.Б.</i> Влияние сочетанного применения парентерального нимодипина и реополиглюкина на функциональное состояние коры головного мозга у пациентов с цереброваскулярной патологией | 341 |
| <i>Климков В.Т., Митрахович А.И., Майорчик А.П.</i> Пути улучшения водоснабжения сельского населения | 346 |
| <i>Колбаско Л.В.</i> Характеристика различных форм анемий, прошедших через гематологический стационар Могилевской областной больницы в 1995—2000 гг. | 348 |
| <i>Коростелева И.Н.</i> Определение фагоцитарной активности лейкоцитов с применением люминесцентного метода анализа | 352 |
| <i>Кручинский Н.Г., Тепляков А.И., Плетнев С.В., Новиков Д.В., Теплякова Д.В., Прокопович А.С., Ковалева Л.Н., Хохлова В.Л., Мухачев Б.В., Остапенко В.А.</i> Методика экстракорпоральной аутогемамагнитотерапии (ЭАГМТ) в комплексной терапии распространенного атеросклероза у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: оценка влияния на состояние системы гемостаза, реологические свойства крови и некоторые структурно-функциональные параметры эритроцитов | 354 |
| <i>Кушнеров А.И., Тихонов Ю.В., Цариков В.В.</i> Ультразвуковое исследование в диагностике опухолевых поражений ободочной и прямой кишок — качественно новый этап лучевой диагностики в проктологии | 364 |
| <i>Кушнеров А.И., Тихонов Ю.В., Цариков В.В.</i> Гидросонография неспецифического язвенного колита — новые концепции в диагностике | 366 |
| <i>Марочков А.В.</i> Принципы возмещения острой массивной кровопотери | 367 |
| <i>Марочков А.В., Ахременко М.М.</i> Экология анестезиолога-реаниматолога (3): синдром хронической усталости анестезиологов-реаниматологов | 376 |
| <i>Петровский А.Н., Морозов И.А., Кручинский Н.Г.</i> Перспективы использования целлюлозы и ее производных в клинической практике | 378 |

| | |
|---|-----|
| <i>Прокопович А.С.</i> Диагностика железодефицитных состояний: возможности гематологических анализаторов | 381 |
| <i>Прокопович А.С., Дымова Л.Г., Севастьянов Д.П., Чегерова Т.И., Тепляков А.И., Коростелева И.Н., Горчаков А.М., Кручинский Н.Г., Севастьянов П.В.</i> Оценка результатов гематологических исследований в клиничко-диагностической лаборатории. | 385 |
| <i>Сиваков В.П., Подпалов В.П.</i> Прогнозирование развития артериальной гипертонии на основе исследования вариабельности ритма сердца | 387 |
| <i>Симченко Н.И., Быков О.Л.</i> Экспертные системы для иммунологического прогнозирования течения и исхода пиелонефритов | 391 |
| <i>Симченко Н.И., Крутолевич С.К.</i> Определение информативности показателей медицинских экспертных систем. | 392 |
| <i>Симченко Н.И.</i> Качественные и количественные изменения эритроцитов и тромбоцитов при пиелонефритах. | 395 |
| <i>Симченко Н.И.</i> Применение ронколейкина для иммунокоррекции при пиелонефритах | 397 |
| <i>Хамадуллин С.Л., Марочков А.В.</i> Результаты интенсивной терапии сосудистых поражений головного мозга. | 401 |
| <i>Чегерова Т.И., Тепляков А.И., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В., Кручинский Н.Г.</i> Методика оценки эффективности медико-профилактических мероприятий на модели проведения клинических испытаний новых фармакологических препаратов | 403 |
| <i>Чуниховский С.П.</i> Применение технологий лечения острого лимфобластного лейкоза у детей в Могилевской областной детской больнице | 408 |
| <i>Яремченко Е.К., Гракова Т.А., Голубь В.Ф., Власова Т.И., Сидорович А.И., Остапенко С.М., Кручинский Н.Г.</i> Алопеция у детей: предварительный анализ опыта 7-летней работы | 412 |