

**ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ АЦИДОФИЛЬНОЙ ПАЛОЧКИ:
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НА ВРОЖДЁННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ****Т.Р. Старовойтов, 2 курс****Научный руководитель – И.В. Бубырь, к.тех.н., доцент****Полесский государственный университет**

Под пробиотиками понимают живые микробные культуры, которые присутствуют в продуктах питания и считаются безопасными для здоровья человека на основании длительной истории использования. В группе лактобацилл, обладающих пробиотическим потенциалом, некоторые виды экспрессируют S-белки. Примером служит *Lactobacillus brevis*, у которого S-слой демонстрирует противовирусную активность в отношении вируса простого герпеса 2-го типа. Имеются также данные о защитном действии S-белка, выделенного из *Lactobacillus plantarum*: он предохраняет энтероциты от повреждений, вызываемых энтеропатогенными штаммами *Escherichia coli*. Механизм действия заключается в блокаде проникновения вирусных частиц в клетки-мишени через рецептор DC-SIGN. Это открытие расширяет представления о пробиотических свойствах *Lactobacillus acidophilus*, подтверждая и дополняя уже известные эффекты.

Белок DC-SIGN относится к классу трансмембранных рецепторов, а именно к С-типу лектинов, активность которых зависит от ионов кальция. Данный рецептор выполняет функцию захвата антигенов с их последующей переработкой и презентацией. В число патогенов, распознаваемых DC-SIGN, входят такие вирусы, как ВИЧ-1, вирус Эбола, вирус Хунин и вирус Денге [1].

Согласно многочисленным работам, Т-лимфоциты, специфически реагирующие на антигенные структуры микробиоты, являются важными регуляторами гомеостатических процессов в кишечнике. Однако более современные данные указывают на вовлеченность в аномальные мукозальные иммунные реакции Т-клеток Th17, секретирующих интерлейкин-17 (IL-17). В клинических исследованиях было зафиксировано повышение экспрессии IL-17, увеличение числа Th17-клеток и рост концентрации IL-17 в сыворотке крови у пациентов, как с язвенным колитом, так и с болезнью Крона.

Суммируя накопленные к настоящему времени научные данные, можно утверждать, что Treg-популяция принимает активное участие в патологических процессах при аутоиммунных расстройствах, а также при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК). Особое значение для кишечного гомеостаза имеют Treg-клетки, продуцирующие IL-10 – цитокин с выраженной противовоспалительной активностью. Доказательством этого служит тот факт, что у мышей с генетическим дефицитом IL-10 спонтанно развивается колит.

В ходе экспериментов Park и соавт. (2018) на мышинной модели аллергической патологии было установлено, что применение данного пробиотика сопровождается уменьшением концентрации IL-6 и IL-17 в сыворотке крови, а также угнетением синтеза IL-17A и транскрипционного фактора ROR γ t в тканях селезенки. Более поздние данные свидетельствуют о том, что пероральный прием *L. acidophilus* приводит к подавлению продукции IL-17, TNF- α и IL-23, а также экспрессии STAT3 и его фосфорилированной формы в толстокишечной стенке при моделировании колита с использованием декстрансульфата натрия (ДСС). В отношении Treg-клеток получены следующие результаты: на модели воспаления кишечника, индуцированного 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислотой (TNBS), терапия *L. acidophilus* способствовала активной пролиферации (экспансии) регуляторных Т-клеток в интраэпителиальных лимфоцитах и клеточных популяциях собственной пластинки слизистой оболочки кишечника. Кроме того, на аллергической модели *in vivo* зафиксировано повышение уровней экспрессии маркеров CD25, Foxp3 и цитокина TGF- β в селезенке у животных, получавших *L. acidophilus* [2].

С целью детального изучения биологической роли липотейхоевой кислоты (LTA) у *Lactobacillus acidophilus* в условиях целостного организма был сконструирован мутантный штамм, у которого отсутствует ген, кодирующий фосфоглицеролтрансферазу – ключевой фермент биосинтетического пути LTA.

В отличие от животных, получавших штамм дикого типа, пероральное введение LTA-дефицитного варианта *L. acidophilus* не только препятствовало развитию Т-клеточного колита, ин-

дуцированного химическими агентами или патогенными микроорганизмами, но и обеспечивало быстрое купирование уже сформировавшегося воспалительного процесса.

Эффективность подтверждалась следующими клиническими показателями: уменьшением массы тела, снижением выраженности диареи и интенсивности скрытого кровотечения из кишечника, а также улучшением индекса активности заболевания. Сходным образом, у генетически предрасположенных животных применение LTA-дефицитного штамма приводило к значимому обратному развитию предраковых изменений толстой кишки. Проведенный авторами анализ показал, что протективный эффект в отношении колита ассоциирован с ростом популяции дендритных клеток (ДК), секретирующих ИЛ-10, и увеличением числа индуцированных регуляторных Т-клеток (iTreg). В свою очередь, регрессия полипоза сопровождалась генеральным ослаблением локальных и системных иммунных реакций, что коррелировало с восстановлением функциональной активности и стабильности Treg-клеток [2].

Заслуживает внимания тот факт, что провоспалительные Treg-субпопуляции были выявлены также у пациентов с колоректальным раком (КРР). Это наблюдение дополнительно обосновывает клинический потенциал LTA-дефицитного *L. acidophilus* для терапии кишечных заболеваний, особенно с учетом его способности подавлять формирование провоспалительных регуляторных Т-клеток фенотипа FoxP3⁺ RORγt⁺.

Кроме того, при совместном культивировании *in vitro* дендритных клеток с LTA-дефицитным штаммом *L. acidophilus* наблюдалось формирование у них регуляторного фенотипа. Это подтверждалось усиленной продукцией интерлейкина-10 (ИЛ-10), сниженной экспрессией костимулирующих молекул, а также сопутствующим уменьшением секреции ИЛ-12 и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). Вместе с тем, у мышей линии IL-10^{-/-} *in vivo* позитивного эффекта в отношении ИЛ-10 зафиксировано не было. Данный факт подчеркивает ключевую роль этого противовоспалительного цитокина в контроле патологического воспаления кишечника в нашей экспериментальной системе, что согласуется с результатами, полученными другими авторами.

Ранее было продемонстрировано, что позитивная продукция ИЛ-10 регуляторными дендритными клетками опосредуется активацией внеклеточных сигнал-регулируемых киназ 1 и 2 (ERK1/2), тогда как угнетение секреции ИЛ-12 является следствием блокады активации p38.

Дополнительные эксперименты показали, что стимуляция дендритных клеток LTA-дефицитным штаммом *L. acidophilus* вызывала лишь незначительную TLR2-опосредованную продукцию цитокинов и не сопровождалась усилением экспрессии данного паттерн-распознающего рецептора (PRR) [3].

Проведенный анализ литературных данных позволяет утверждать, что *Lactobacillus acidophilus* обладает широким спектром клинически значимых пробиотических и иммуномодулирующих свойств: она подавляет провоспалительные Th17-ответы (снижая IL-6, IL-17, TNF-α и IL-23), стимулирует экспансию регуляторных Т-клеток (Treg) и продукцию ИЛ-10, активирует сигнальный путь ERK1/2, блокирует проникновение вирусов через рецептор DC-SIGN за счёт белков S-слоя, а также предотвращает и купирует Т-клеточный колит и предраковые изменения толстой кишки при использовании LTA-дефицитных штаммов.

Список использованных источников

1. Prado Acosta M., Ruzal S. M., Cordo S. M. S-layer proteins from *Lactobacillus* sp. inhibit bacterial infection by blockage of DC-SIGN cell receptor // *International Journal of Biological Macromolecules*. 2016. Vol. 92. P. 998-1005. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2016.07.096.
2. Park J. S., Choi J. W., Jhun J. Y., et al. *Lactobacillus acidophilus* Improves Intestinal Inflammation in an Acute Colitis Mouse Model by Regulation of Th17 and Treg Cell Balance and Fibrosis Development // *Journal of Medicinal Food*. 2018. Vol. 21 (3). P. 215-224. DOI: 10.1089/jmf.2017.3990.
3. Lightfoot Y. L., Selle K., Yang T., et al. Tailoring gut immune responses with lipoteichoic acid-deficient *Lactobacillus acidophilus* // *Frontiers in Immunology*. 2013. Vol. 4. P. 25. DOI: 10.3389/fimmu.2013.00025.